

Tìm kiếm version 3

Cho hai dãy số nguyên a_1, a_2, \dots, a_n và b_1, b_2, \dots, b_m . Với mỗi chỉ số i ($1 \leq i \leq m$) hãy tìm sự xuất hiện của b_i trong dãy a_1, a_2, \dots, a_n .

Dữ liệu vào:

- Dòng đầu ghi hai số nguyên dương n và m .
- Dòng thứ hai ghi n số nguyên a_1, a_2, \dots, a_n .
- Dòng thứ ba ghi m số nguyên b_1, b_2, \dots, b_m .

Hai số liên tiếp trên một dòng được ghi cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra:

Một dòng duy nhất chứa m số nguyên, trong đó số thứ i ($1 \leq i \leq m$) là chỉ số j nhỏ nhất mà $a_j = b_i$ (nếu tồn tại) và là 0 nếu ngược lại. Hai số liên tiếp được ghi cách nhau một dấu cách.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

```
7 5
6 4 7 2 4 1 3
3 1 5 4 8
```

Dữ liệu ra:

```
7 6 0 2 0
```

Giới hạn: $1 \leq n, m \leq 10^5$; $|a_i|, |b_i| \leq 10^9$.